БЕРЕС АМИНОФОРТЕ

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА:
жидкость

УПАКОВКА:
канистра 1 л

НОРМЫ РАСХОДА:
50 - 150 мл на 1 тонну семян
(50 мл/т, 100 мл/т, 150 мл/т)

50 - 150 мл на 1 гектар посевов
(50 мл/га, 100 мл/га, 150 мл/га)

СОСТАВ:
- органическое в-во..50 г/л
- альгиновая к-та.....10 г/л
- аминокислоты.....20 г/л
- магний (Mg).....65 г/л
- азот (N).....60 г/л
- бор (B).....5 г/л
- молибден (Mo).....2,6 г/л

pH 5,5-7,5
плотность 1,05 г/см^3

БЕРЕС АминоФорте

Жидкий биостимулятор на основе экстракта морских водорослей, произведенный путем энзимного гидролиза из высокопротеиновых морских водорослей. Стимулирует рост и развитие растений, обладает мощным антистрессовым действием и высокими иммуностимулирующими свойствами, обеспечивает быстрое восстановление растений после стрессов, способствует увеличению урожая и улучшению качества растениеводческой продукции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
- обработка семян совместно с протравителем, либо самостоятельное внесение;
- некорневая, корневая подкормка, фертигация, капельный полив - совместно с СЗР, либо самостоятельное внесение.

Культура	Обработка семян	Фазы применения		
Зерновые яровые и озимые	протравливание семян	кущение - начало выхода в трубку	флаговый лист - колошение	цветение - начало молочной спелости
Кукуруза	протравливание семян	появление 3-8 листьев	трубкование	выметывание метелки
Гречиха	протравливание семян	первая пара настоящих листьев - ветвление	бутонизация	цветение, образование плодов
Горох, нут, соя, чечевица, фасоль	инокуляция	всходы - листья первого яруса	листья второго - четвертого яруса	цветение, формирование бобов
Рапс, горчица, сурепица, яровые и озимые	протравливание семян	формирование листовой розетки - ветвление	рост стебля - начало бутонизации	бутонизация - начало цветения, образование стручков
Лен, рыжик	протравливание семян	ёлочка	бутонизация, цветение	созревание семян
Подсолнечник	протравливание семян	2-4 пары настоящих листьев	6-8 пар настоящих листьев	формирование корзинки - начало цветения
Свекла сахарная и столовая	протравливание семян	2-4 пары настоящих листьев	4-8 пар настоящих листьев - смыкания растений в рядках	смыкание растений в междурядиях
Картофель	замачивание клубней перед посадкой на 15 часов	всходы-высота растений 10-15 см	рост стеблей, бутонизация	цветение - образование клубней
Пасленовые (томаты, перец, баклажан)	замачивание семян перед посадкой на 18-20 часов	появление 2-4 листьев	активный вегетативный рост - формирование завязи	налив плодов - созревание
Капуста	замачивание семян перед посадкой на 15 часов	через 2-3 дня после высадки рассады	4-5 настоящих листьев - начало завязывания головки	формирование кочана
Морковь	замачивание семян перед посадкой на 15 часов	всходы - образование 1-2 настоящих листа	активный рост листьев	рост корнеплода, формирование корнеплода
Лук, чеснок, редис	замачивание семян перед посадкой на 15 часов	появление 2-3 листьев	активный вегетативный рост	начало формирования - рост луковицы корнеплода
Плодово-ягодные	замачивание черенков, рассады перед посадкой на 12-24 часа	фаза розового бутона	перед началом цветения	рост завязей плодов
Виноград	замачивание черенков, саженцев перед посадкой на 12-24 часа	бутонизация	после цветения	налив ягод
Цветочные культуры	замачивание клубней, луковиц, черенков, семян перед посадкой на15 часов	всходы - 2-3 листа	появление 5-7 листьев	бутонизация

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

1. Перед использованием тару с органоминеральным удобрением Берес® тщательно взболтать.

2. Наполнить бак опрыскивателя или протравочной машины водой на 2/3 объема. Включить перемешивающее устройство.

3. Добавить подготовленный согласно инструкции производителя раствор пестицидов и прочих препаратов. Тщательно перемешать.

4. Не выключая перемешивающее устройство, добавить органоминеральное удобрение Берес® согласно дозировке.

5. Долить воды до расчетного объема согласно нормам расхода. Тщательно перемешать.

6. Баковая смесь готова. Использовать в день приготовления.

Обработку рекомендуется проводить свежеприготовленным рабочим раствором в утренние или вечерние часы в сухую безветренную погоду.