



## БЕРЕС® - 8 СУПЕР ГУМАТ С ФУЛЬВОКИСЛОТАМИ И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ, КОНЦЕНТРАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С БОРОМ 7%

### СОСТАВ:

	г/л	%
■ бор (B).....	90	7
■ азот (N).....	51,2	4
■ гуминовые кислоты.....	31,5	2,97
■ фульвовые кислоты.....	13,5	1,26
■ янтарная кислота.....	0,107	0,009
■ фосфор (P).....	0,0009	0,00009
■ калий (K).....	4,77	0,45
■ натрий (Na).....	0,72	0,07
■ цинк (Zn).....	0,056	0,005
■ медь (Cu).....	0,056	0,005
■ марганец (Mn).....	0,019	0,002
■ железо (Fe).....	0,89	0,084

	г/л	%
■ молибден (Mo).....	0,045	0,004
■ кобальт (Co).....	0,07	0,007
■ никель (Ni).....	0,06	0,005
■ кремний (Si).....	0,027	0,003
■ селен (Se).....	0,03	0,003
■ йод (I).....	0,02	0,002
■ магний (Mg).....	0,13	0,014
■ кальций (Ca).....	1,13	0,11
■ сера (S).....	0,59	0,055

pH 8-8,5  
плотность 1,28 г/см<sup>3</sup>

### БЕРЕС® - 8 СУПЕР ГУМАТ С ФУЛЬВОКИСЛОТАМИ И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ, КОНЦЕНТРАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С БОРОМ 7%

комплексное органоминеральное борсодержащее удобрение с антистрессовыми, ростостимулирующими, иммуностимулирующими свойствами. Содержит бор в органической легкодоступной для растений форме, фульвовые и гуминовые кислоты, янтарную кислоту, макро- и микроэлементы.

Устраняет дефицит бора и предотвращает различные физиологические расстройства, вызванные дефицитом бора. Усиливает цветение, повышает фертильность пыльцы и формирование завязей. Увеличивает плодообразование. Повышает устойчивость к болезням и стрессам. Способствует увеличению урожая и повышению качества растениеводческой продукции.

**ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА:**  
жидкость

**УПАКОВКА:**  
канистра 5 л

**НОРМЫ РАСХОДА:**  
0,5-1 л на 1 гектар посевов

Культура	Обработка семян	Фазы применения		
Зерновые яровые и озимые		кущение - начало выхода в трубку	флаговый лист - колошение	цветение - начало молочной спелости
Кукуруза		появление 3-8 листьев	трубкование	выметывание метелки
Гречиха		первая пара настоящих листьев - ветвление	бутонизация	цветение, образование плодов
Горох, нут, соя, чечевица, фасоль		всходы - листья первого яруса	листья второго - четвертого яруса	бутонизация - начало цветения, образование стручков
Рапс, горчица, сурепица, яровые и озимые		формирование листовой розетки - ветвление	рост стебля - начало бутонизации	бутонизация - начало цветения, образование стручков
Лен, рыжик		ёлочка	бутонизация, цветение	созревание семян
Подсолнечник		2-4 пары настоящих листьев	6-8 пар настоящих листьев	формирование корзинки - начало цветения
Свекла сахарная и столовая		2-4 пары настоящих листьев	4-8 пар настоящих листьев - смыкания растений в рядках	смыкание растений в междурядьях
Картофель		всходы-высота растений 10-15 см	рост стеблей, бутонизация	цветение - образование клубней
Пасленовые (томаты, перец, баклажан)		появление 2-4 листьев	активный вегетативный рост - формирование завязи	налив плодов - созревание
Капуста		через 2-3 дня после высадки рассады	4-5 настоящих листьев - начало завязывания головки	формирование кочана
Морковь		всходы - образование 1-2 настоящих листа	активный рост листьев	рост корнеплода, формирование корнеплода
Лук, чеснок, редис		появление 2-3 листьев	активный вегетативный рост	начало формирования - рост луковицы корнеплода
Плодово-ягодные		фаза розового бутона	перед началом цветения	рост завязей плодов
Виноград		бутонизация	после цветения	налив ягод
Цветочно-декоративные культуры		всходы - 2-3 листа	появление 5-7 листьев	бутонизация

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- некорневая подкормка, корневая подкормка, фертигация, капельный полив - совместно с СЗР, либо самостоятельное внесение.

#### ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

1. Перед использованием тару с органоминеральным удобрением Берес® тщательно взболтать.
2. Наполнить бак опрыскивателя или протравочной машины водой на 2/3 объема. Включить перемешивающее устройство.
3. Добавить подготовленный согласно инструкции производителя раствор пестицидов и прочих препаратов. Тщательно перемешать.
4. Не выключая перемешивающее устройство, добавить органоминеральное удобрение Берес® согласно дозировке.
5. Долить воды до расчетного объема согласно нормам расхода. Тщательно перемешать.
6. Баковая смесь готова. Использовать в день приготовления.